


ŚWINKA

(NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC)

szczepienia 



CZYNNIK

wirus świnki obecny w ślinie i wydzielinie z dróg oddechowych osoby chorej

OBJAWY



- o obrzęk
- o ból ślinianki/ślinianek przyusznych i/lub podżuchwowych
- o gorączka
- o bóle głowy
- o bóle mięśni
- o zmęczenie
- o brak apetytu



POWIKŁANIA

na ogół łagodna choroba, ale zdarzają się powikłania, częściej u mężczyzn niż kobiet

- o zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- o zapalenie trzustki
- o zapalenie mózgu
- o głuchota
- o zapalenie jądra lub jajnika (u nastolatków i dorosłych)
- o bezpłodność



PROFILAKTYKA

- o szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce)
- o szczepionka „żywa” (z osłabionymi wirusami)

2 dawki: w 13-15 m.ż. i 6 r.ż.

osoba dorosła (nieszczepiona): 2 dawki w odstępie 4 tyg.

DWIE DAWKI SZCZEPIONKI ZAPEWNIĄ WYSOKĄ OCHRONĘ. SZCZEPIENIE JEST BEZPIECZNE.

NIE OPRACOWANO SKUTECZNEGO LEKU

EPIDEMIOLOGIA

DROGI ZAKAŻENIA:

- o droga kropelkowa
- o kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi śliną/wydzieliną z dróg oddechowych

150-220

tys.

zachorowań rocznie (w latach epidemicznych w Polsce) przed wprowadzeniem szczepień

1-2

tys.

w ostatnich latach liczba zachorowań ulega zmniejszeniu